



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO SALUTE
SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE,
SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO,
SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO

Viale Vincenzo Verrastro, 9
85100 Potenza (PZ)
tel 0971.668839
fax 0971.668900
gabriella.cauzillo@regione.basilicata.it

Potenza, - 5 NOV. 2012

Prot. n. 194806/2AF

- Al Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Potenza
- Al Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria di Potenza
- Al Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Matera
- Al Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria di Matera
- Al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
- Al Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza

e p.c.,

- Al Direttore F.F. U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ex ASL 1 di Venosa
Dott.ssa Miriam Graziano
- Al Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ex ASL 2 di Potenza
Dott. Francesco Negrone
- Al Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ex ASL 3 di Lagonegro
Dott.ssa Caterina Focaraccio
- Al Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ex ASL 4 di Matera
Dott. Espedito Moliterni
- Al Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ex ASL 5 di Montalbano
Dott.ssa Teresa Russo
- Al Dirigente Medico U.O. Igiene e Sanità Pubblica ex ASL 1 di Venosa
Dott.ssa Silvana Schettini - Ufficio Sanitario di Rionero c/o C.R.O.B.
- Al Dirigente U.O. Igiene e Sanità Pubblica ex ASL 2 di Potenza
Dott.ssa Morena Maldini - Ufficio Sanitario di Potenza
- Al Dirigente U.O. Igiene e Sanità Pubblica ex ASL 3 di Lagonegro
Dott.ssa Marina Marandola - Ufficio Sanitario di Lauria
- Al Segretario Regionale FIMMG
Dott. Antonio Santangelo - Sede di Potenza
- Al Segretario Regionale FIMP
Dott. Eustachio Sarra - Sede di Matera
- Al Direttore U.O. Malattie Infettive Azienda Ospedaliera San Carlo
Dott. De Stefano Carlo
- Al Direttore U.O. Malattie Infettive Ospedale di Matera
Dott. Giulio De Stefano
- Al Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Potenza
- Al Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Matera

L O R O S E D I

Oggetto: Vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica 2012-2013.
Organizzazione ed avvio della campagna vaccinale.

Causa le note ed attuali problematiche inerenti la disponibilità di vaccino antinfluenzale a livello nazionale, per cui questo Dipartimento è in attesa di disposizioni in merito da parte del Ministero della Salute, considerato anche che il picco della malattia influenzale si ha nel mese di febbraio e che ciò ha comportato negli ultimi anni lo spostamento dell'avvio della campagna vaccinale dal mese di ottobre al mese di novembre da parte di molte regioni, in primis quelle meridionali, le vaccinazioni antinfluenzale ed antipneumococcica saranno avviate nella Regione Basilicata il giorno 26 novembre p.v..



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO SALUTE
SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**
UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE.
SANITA' PUBBLICA. MEDICINA DEL LAVORO.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO

Viale Vincenzo Verrastro, 9
85100 Potenza (PZ)
tel 0971.668839
fax 0971.668900
gabriella.cauzillo@regione.basilicata.it

Nel frattempo si chiede alle U.O. di Igiene e Sanità Pubblica, che dovranno coordinare le attività vaccinali assicurando che le vaccinazioni in proposito si effettuino, come sempre, presso tutti i comuni della Regione, al fine del buon esito della campagna, di informare con la presente i medici vaccinatori ASL, ma anche i Medici di Medicina Generale ricadenti nei rispettivi ambiti zionali, nonché di provvedere al ritiro e alla distribuzione dei vaccini antinfluenzali ed antipneumococcici già acquisiti con le gare espletate dall'ASP.

In merito alla vaccinazione antipneumococcica ed in particolare alla vaccinazione con il nuovo vaccino antipneumococcico 13 valente coniugato, di recente validato dal Ministero della Salute e dall'AIFA anche per l'utilizzo in età adulta ed anziana, in particolare per le categorie a rischio \leq a 64 anni e per la popolazione \geq 65anni, il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Politiche vaccinali raccomanda, al pari di altre regioni, di attenersi alla strategia vaccinale indicata nella Tabella A, allegata alla presente, anche su condivisione dell'Assessore e del Dirigente Generale.

Tale strategia segue specificatamente le indicazioni del Calendario della Vita, anno 2012, redatto dalle Società Scientifiche Italiane dei Medici di Medicina Generale (FIMMG), dei Medici Igienisti (SItI) e dei Medici Pediatri (SIP).

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente Generale
Dott. Domenico Tripaldi

Il Dirigente dell'Ufficio Politiche della Prevenzione

Dott.ssa Gabriella Cauzillo

Il Dirigente Medico Ufficio Politiche della Prevenzione

Dott. Francesco Locuratolo

Referente:

Dott. Francesco Locuratolo

tel .uff. 0971668822 - fax 0971668856

e mail francesco.locuratolo@regione.basilicata.it

Allegato:

Tabella A: vaccinazione antipneumococcica 2012-2013



REGIONE BASILICATA

Tabella A – Vaccinazione antipneumococcica 2012-2013

Strategia vaccinale:

- a. soggetti naive per la vaccinazione antipneumococcica, di età ≥ 65 anni: una dose di vaccino PCV 13valente;
- b. . soggetti naive per la vaccinazione antipneumococcica di età compresa tra 50-64 anni: una dose di vaccino PCV 13 valente, appartenenti alle seguenti categorie a rischio:
 - cardiopatie croniche;
 - malattie polmonari croniche;
 - cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive da alcolismo;
 - diabete mellito;
- c. soggetti naive di età compresa tra i 5-50 anni, una dose di vaccino 13 valente seguita da una dose di vaccino PPV 23 valente dopo non meno di otto settimane, appartenenti alle seguenti categorie ad alto rischio:
 - HIV positivi;
 - portatori di impianti cocleari;
 - insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica;
 - immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa;
 - trapianto d'organo o di midollo;
 - neoplasie diffuse;
 - leucemie, linfomi, mieloma multiplo;
 - asplenia anatomico-funzionale;
 - immunodeficienze congenite o acquisite;
 - anemia falciforme, talassemia;
 - fistole liquorali.
- d. soggetti ad alto rischio che abbiano ricevuto in precedenza una o più dosi di PPV 23 da uno o più anni: somministrare una dose di PCV 13 ad almeno un anno di distanza dall'ultima dose di PPV.

I soggetti ad alto rischio di età compresa tra i 5 e i 50 anni, di cui ai punti c e d, al momento non sono compresi nelle indicazioni della scheda tecnica (RCP) del PCV 13, anche se è evidente che in tali soggetti l'esito del rapporto rischio-beneficio è a favore di quest'ultima, pertanto si raccomanda che il medico vaccinatore informi in modo adeguato la persona da vaccinare e ne acquisisca il consenso informato scritto.

Pur essendo la vaccinazione antinfluenzale un'occasione preziosa per l'offerta simultanea della vaccinazione antipneumococcica si evidenzia che quest'ultima può essere offerta attivamente e gratuitamente in qualsiasi altro momento dell'anno.

Le suddette indicazioni potranno essere modificate alla luce di nuove ed ulteriori acquisizioni scientifiche

Si allega documentazione e bibliografia.

Letto, condiviso e sottoscritto.

Potenza, 25/10/2012