

- 1] Indicare quale fra questi è un farmaco antidepressivo:**
 - A) fenilbutazone
 - B) amitriptilina
 - C) fibrati
- 2] Le neoplasie sono causate anche dalle radiazioni ionizzanti perché:**
 - A) inducono mutazioni in macromolecole informazionali (DNA, RNA, proteine)
 - B) provocano apoptosi cellulare
 - C) provocano lesioni della cute
- 3] L'anemia ipocromica è determinata da:**
 - A) iduzione del contenuto emoglobinico medio
 - B) riduzione della concentrazione emoglobinica corpuscolare media
 - C) riduzione del volume corpuscolare medio
- 4] I criptosporidi sono responsabili di:**
 - A) polmoniti
 - B) febbre
 - C) diarrea
- 5] Se a distanza di 24-48 ore da una frattura di femore compare confusione mentale, allucinazioni, vomito, bisogna pensare a:**
 - A) ictus cerebrale
 - B) focolaio epilettico
 - C) embolia cerebrale
- 6] Per differenziare una sincope da una crisi epilettica bisogna prestare attenzione a:**
 - A) morsus linguale e periodo post-critico
 - B) acufeni precedenti la perdita di coscienza
 - C) perdita di urine
- 7] Il medico di continuità assistenziale può proporre il ricovero in ospedale?**
 - A) Sì
 - B) No
 - C) Solo a volte
- 8] Cosa provoca l'intossicazione da cromo?**
 - A) coliche addominali, ipertensione
 - B) dermatite ulcerativa, faringotracheite, nefropatia tubulare
 - C) calcolosi renale
- 9] Si effettua un intervento di tracheostomia d'urgenza:**
 - A) nella dispnea per pneumotorace spontaneo
 - B) nella dispnea da sforzo
 - C) nella dispnea per ostruzione delle vie aeree superiori
- 10] In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare?**
 - A) gas
 - B) solida
 - C) liquida

- 11] Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie è:**
- A) la misura dinamometrica
 - B) la valutazione del numero dei posti letto
 - C) il metodo MAPO
- 12] La reazione di rigetto del trapianto è causata da:**
- A) linfociti T del ricevente
 - B) globuli rossi del ricevente
 - C) linfociti B del donatore
- 13] La pressione endoculare nel soggetto normale:**
- A) varia fra 10 e 20 mmHg
 - B) si abbassa con l'età
 - C) oscilla fra 5 e 35 mmHg
- 14] La frattura di Colles è localizzata a livello di:**
- A) piede
 - B) estremità prossimale del femore
 - C) estremità distale del radio
- 15] Cosa s'intende per stipsi?**
- A) la perdita di feci diarroiche, o anche formate, fuori del controllo volontario del soggetto
 - B) una diminuzione di transito delle feci, che diventano dure e difficili da espellere
 - C) il passaggio del contenuto gastrico dallo stomaco verso l'esofago
- 16] Il pavor nocturnus è**
- A) una malattia metabolica
 - B) la paura dei volatili
 - C) una manifestazione d'ansia
- 17] La pressione in arteria polmonare si misura con:**
- A) la sonda di Hegar
 - B) la sonda di Sengstaken-Blackmore
 - C) il catetere di Swan-Ganz
- 18] Quale tra i seguenti farmaci non appartiene alla classe degli antidepressivi triciclici?**
- A) fluoxetina
 - B) ibuprofene
 - C) meropenem
- 19] L'adrenalina viene usata in caso di:**
- A) angina pectoris
 - B) fibrillazione ventricolare
 - C) shock settico
- 20] Indicare la coppia errata.**
- A) Tendine - Muscolo
 - B) Olfatto - Orecchio
 - C) Cuore - Miocardio

- 21] Qual è la caratteristica della miopia?**
A) il bulbo oculare è più lungo del normale
B) il bulbo oculare è infiammato
C) una curvatura non regolare della cornea
- 22] Un vaccino può essere composto da:**
A) microrganismi morti
B) microrganismi attenuati
C) tutte le precedenti
- 23] Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a:**
A) alterazioni visive
B) alterazioni della propriocezione
C) tutte le precedenti
- 24] Cosa bisogna fare per ottenere un campione di urina sterile?**
A) Cateterizzare necessariamente il paziente
B) La raccolta deve essere eseguita da infermieri professionali
C) Usare preferibilmente l'urina proveniente dal mitto intermedio
- 25] La più frequente causa di cuore polmonare acuto è:**
A) infarto miocardico posteriore
B) stato asmatico
C) embolia polmonare
- 26] Quali figure professionali sono presenti nell'UVG?**
A) medico di base, psichiatra e sociologo
B) medico geriatra, infermiere, sociologo e assistente sociale
C) medico geriatra, medico fisiatra, medico oncologo e infermiere
- 27] Quando si considera contagioso il morbillo?**
A) da due giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell'esantema
B) durante la fase di incubazione
C) dopo la fase esantematica
- 28] La principale modalità di trasmissione del virus dell'epatite A è:**
A) oro-fecale
B) transplacentale
C) attraverso morsi di animali
- 29] Nella relazione con un paziente schizofrenico in generale non è opportuno:**
A) essere autentici
B) relazionarsi con un parente
C) tentare di dimostrare su basi razionali l'inesistenza del delirio
- 30] Nella brucellosi:**
A) l'emocoltura è diagnostica nella prima settimana di malattia e la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia
B) la sierodiagnosi di Wright non è diagnostica
C) l'emocoltura è diagnostica nella prima settimana di malattia