

----- Questionario Q01 -----

1) Le rosette di Flexner - Wintersteiner sono caratteristiche di:

- A) Melanoma della coroide
- B) Carcinoma squamocellulare
- C) Retinoblastoma
- D) Carcinoma mucoepidermoidale
- E) nessuna delle altre risposte è corretta

2) Secondo la Legge 138/2001 si definiscono ipovedenti gravi coloro che hanno:

- A) Residuo visivo non superiore a 2/10 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%
- B) Residuo visivo non superiore a 1/20 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%
- C) Residuo visivo non superiore a 3/10 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%
- D) Residuo visivo non superiore a 1/10 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%
- E) Residuo visivo non superiore a 1/50 o residuo perimetrico binoculare inferiore 40%

3) La tilosi consiste in:

- A) Assenza delle ciglia che compare dopo la nascita
- B) Decolorazione congenita delle ciglia
- C) Decolorazione delle ciglia che compare dopo la nascita
- D) Assenza congenita delle ciglia
- E) Impianto abnorme delle ciglia

4) L'astigmatismo totale dell'occhio è dovuto a:

- A) Difetto di curvatura del cristallino
- B) Difetto di curvatura della cornea e del cristallino
- C) Aumento dell'indice di rifrazione della cornea
- D) Aumento dell'indice di rifrazione del cristallino
- E) Difetto della curvatura della cornea

5) L'ipermetropia è massima:

- A) Nell'adolescenza
- B) Nella seconda infanzia
- C) Nella maturità
- D) Nella prima infanzia
- E) Indipendentemente dall'età

6) La frattura traumatica del pavimento orbitario comporta:

- A) Enoftalmo, diplopia nello sguardo in basso e ptosi
- B) Diplopia nello sguardo in basso
- C) Diplopia
- D) Ptosi

----- Questionario Q01 -----

E) nessuna delle altre risposte è corretta

7) Nei portatori di lenti corneali la principale causa di edema corneale è:

- A) L'anossia
 - B) L'iperglicemia
 - C) L'ipoglicemia
 - D) Lo sforzo accomodativo
 - E) L'ipercorrezione
-

8) Formazione della immagine retinica:

- A) Reale, rimpicciolita e diritta
 - B) Virtuale, rimpicciolita e diritta
 - C) Reale, ingrandita e diritta
 - D) Reale, rimpicciolita e rovesciata
 - E) Reale, ingrandita e rovesciata
-

9) Il senso stereoscopico è:

- A) La percezione prospettica del colore
 - B) La percezione in prospettiva delle immagini visive
 - C) Un sesto senso
 - D) Un fatto tattile
 - E) Concernente il colore
-

10) Il punto di passaggio tra retina viva e retina cieca è definito «ora serrata»; a questo livello la retina:

- A) Subisce un assottigliamento e aderisce all'epitelio pigmentato
 - B) Mantiene invariato il suo spessore
 - C) Aderisce all'epitelio pigmentato
 - D) nessuna delle altre risposte è corretta
 - E) Aumenta di spessore
-

11) Nei casi iniziali di glaucoma cronico semplice come prova da carico viene utilizzata:

- A) farmaci adrenergici
 - B) alcool
 - C) derivati della marijuana
 - D) acqua
 - E) farmaci osmotici
-

12) Un fascio di raggi luminosi che convergono su un punto ha, alla distanza di 1 mt dal fuoco, una vergenza positiva di:

- A) + 1 diottria

----- Questionario Q01 -----

- B) + 0,1 diottria
 - C) + 10 diottrie
 - D) + 5 diottrie
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

13) Lo sviluppo maculare è completo:

- A) Al sesto mese dopo la nascita
 - B) Alla nascita
 - C) Al terzo mese di vita embrionaria
 - D) A due settimane di vita
 - E) A tre settimane e mezzo
-

14) Il secondo punto nodale dell'occhio:

- A) È il punto di incrocio dei raggi dopo la rifrazione attraverso i mezzi diottrici
 - B) È sito in vicinanza del polo posteriore del cristallino
 - C) È il centro di rotazione dell'occhio
 - D) È la somma delle prime due
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

15) La cataratta nelle fasi non completamente evoluta può determinare:

- A) Diplopia monoculare
 - B) Poliopia
 - C) nessuna delle altre risposte è corretta
 - D) Diplopia binoculare
 - E) Le prime due
-

16) La visione binoculare è normo sviluppata quando:

- A) Il parallelismo oculare
 - B) La corrispondenza biretinica normale
 - C) La stereopsi
 - D) Le prime tre
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

17) A livello retinico i coni sono localizzati prevalentemente:

- A) All'estrema periferia
 - B) Sul settore retinico nasale
 - C) Su tutto l'ambito retinico, macula esclusa
 - D) A livello maculare
 - E) Nello strato delle fibre ottiche
-

----- Questionario Q01 -----

18) L'agonista controlaterale del muscolo retto superiore destro è:

- A) Il piccolo obliquo sinistro
 - B) Il retto inferiore sinistro
 - C) Il grande obliquo sinistro
 - D) Il retto superiore sinistro
 - E) L'elevatore palpebrale
-

19) Tra le seguenti caratteristiche di cataratta una NON è corretta. Indicare quale:

- A) cataratta nucleare
 - B) cataratta pigmentata
 - C) cataratta corticale
 - D) cataratta morgagnana
 - E) cataratta intumescente
-

20) Il simblefaron è una patologia congiuntivale e può essere dovuta:

- A) A causticazioni corneo - congiuntivali
 - B) A malattie mucosinechianti
 - C) A congiuntiviti allergiche
 - D) Alla prima e o alla seconda insieme
 - E) A congiuntiviti batteriche
-

21) L'elettroretinogramma è estinto:

- A) Nella sub-atrofia ottica
 - B) Nella degenerazione tapeto - retinica
 - C) Nelle degenerazioni maculari
 - D) Nelle emianopsie
 - E) In foro maculare
-

22) Il torcicollo oculare interferisce sullo sviluppo scheletrico:

- A) della faccia
 - B) del cranio
 - C) degli arti superiori
 - D) del rachide
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

23) Nella cheratite erpetica è presente più frequentemente:

- A) Iperestesia corneale
- B) Ipoestesia corneale
- C) Normoestesia corneale
- D) Ipoestesia congiuntivale
- E) Iperestesia corneo congiuntivale

----- Questionario Q01 -----

24) La visione di cerchi colorati intorno alle luci può essere sintomo:

- A) Di glaucoma
 - B) Di neurite ottica
 - C) Di cataratta
 - D) Di anello di Kayser - Fleischer
 - E) Di strabismo
-

25) Lo scotoma centrale relativo per il verde:

- A) È indice di lesione delle radiazioni ottiche
 - B) È indice di lesione del fascio centrale del nervo ottico
 - C) È indice di cataratta corticale
 - D) È la prima e la terza
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

26) Il quadro oftalmologico della neurite ottica retrobulbare è caratterizzato:

- A) Dall'edema papillare
 - B) Da stasi venosa
 - C) Dall'assenza di alterazioni
 - D) Dalla presenza di emorragia
 - E) Dalla presenza in sede retinica di essudati
-

27) Quale tra queste non è una caratteristica del Nistagmo latente-manifesto?

- A) La direzione è indipendente dall'occhio fissante
 - B) A scosse
 - C) Quasi sempre si associa a strabismo
 - D) Aumenta con l'occlusione monolaterale
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

28) Una diottria prismatica è quella di un prisma che fa deviare il raggio incidente di:

- A) 0,1 cm alla distanza di 1 m
 - B) 10 cm alla distanza di 1 m
 - C) 1 cm alla distanza di 1 m
 - D) 1 cm alla distanza di 10 m
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

29) Nel glaucoma il deficit del campo visivo generalmente ha inizio:

- A) Nel settore temporale superiore
- B) Nel settore nasale inferiore
- C) Nel settore nasale superiore
- D) Nel settore temporale inferiore

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI – IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA
N. 3 Posti di C.P.S. ORTOTTISTA - Cat. D**

----- **Questionario Q01** -----

E) nessuna delle altre risposte è corretta

30) L'effetto prismatico di lenti sferiche è dovuto a:

- A) differenza dell'indice di rifrazione
 - B) decentramento della lente
 - C) differente velocità della luce tra l'aria e la lente
 - D) La prima e la terza
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-