

----- Questionario Q02 -----

**1) I nevi della coroide:**

- A) Sono rari
  - B) Sono abbastanza comuni
  - C) Sono tipici solo di alcune razze
  - D) Non è descritta patologia melanocitaria nella coroide
  - E) Vanno sempre asportati per il rischio di evoluzione melanomatosa
- 

**2) Quale proprietà corneale sfrutta l'Oftalmometro?**

- A) La trasparenza
  - B) La specularità
  - C) La rifrazione
  - D) la prima e la quarta
  - E) Nessuna delle altre risposte è corretta
- 

**3) Una diminuzione rapida e importante della glicemia è associata:**

- A) aumento dell'errore rifrattivo ipermetropico
  - B) nessun cambiamento dell'errore rifrattivo
  - C) aumento della presbiopia
  - D) aumento dapprima miopico, poi ipermetropico
  - E) aumento dell'errore rifrattivo miopico
- 

**4) Quale vitamina si trova in abbondanza nel cristallino:**

- A) Vit. A
  - B) Vit. B6
  - C) Vit. C
  - D) Vit. E
  - E) Vit. K
- 

**5) Il torcicollo oculare è atteggiamento compensatore di:**

- A) Falsa localizzazione dell'immagine
  - B) Diplopia monoculare
  - C) Confusione
  - D) nessuna delle altre risposte è corretta
  - E) Diplopia binoculare
- 

**6) Il flemmone orbitario può comportare come complicanza:**

- A) Trombosi del seno cavernoso
- B) Distacco retinico
- C) nessuna delle altre risposte è corretta
- D) Meningite

----- Questionario Q02 -----

E) Ipertensione endocranica

---

**7) I coni e bastoncelli si trovano:**

- A) Nello strato dell'epitelio pigmentato
  - B) Nello strato più interno della retina
  - C) In uno degli strati intermedi della retina
  - D) Nello strato più esterno della retina
  - E) Nella lamina fusca
- 

**8) Nella macula c'è la maggior concentrazione:**

- A) Di coni
  - B) Di bastoncelli
  - C) Di fibre ganglionari
  - D) Di cellule bipolari
  - E) nessuna delle altre risposte è corretta
- 

**9) Un rhabdomyosarcoma oculare è:**

- A) Un processo degenerativo
  - B) Un tumore benigno dei tessuti molli
  - C) Una neoplasia maligna a differenziazione muscolare
  - D) Una neoplasia maligna a differenziazione cartilaginea
  - E) Una neoplasia maligna a differenziazione linfo - ghiandolare
- 

**10) In ogni caso di glaucoma acuto si usano:**

- A) Pilocarpina
  - B) Inibitori dell'anidrasi carbonica
  - C) Osmotizzanti
  - D) Beta - bloccanti
  - E) nessuna delle altre risposte è corretta
- 

**11) Nel glaucoma congenito abbiamo:**

- A) microftalmo
  - B) criptoftalmo
  - C) bulbo normale
  - D) buftalmo
  - E) abolizione della camera anteriore
- 

**12) Che cos'è il test di Amsler?**

- A) un test per valutare le metamorfopsie
- B) un test per valutare la densità della cataratta

**----- Questionario Q02 -----**

- C) un test per valutare la riduzione della capacità visiva
  - D) un test per valutare la variazione della pressione oculare
  - E) un test per valutare le miodesopsie
- 

**13) Che cos'è la Rodopsina?**

- A) Pigmento fotosensibile dei coni e dei bastoncelli
  - B) Pigmento fotosensibile dei coni
  - C) Pigmento presente sulla coroide
  - D) Pigmento fotosensibile dei bastoncelli
  - E) Pigmento presente nello stroma irideo
- 

**14) L'«eccentricità» di fissazione vera:**

- A) È evento monoculare
  - B) È evento binoculare
  - C) Dipende dallo stato accomodativo
  - D) Dipende dal grado di adattamento luminoso
  - E) Dipende dalla distanza dell'oggetto
- 

**15) Quale di queste funzioni ha bisogno della visione binoculare:**

- A) L'acutezza visiva
  - B) Il senso cromatico
  - C) La stereopsi
  - D) Il senso luminoso
  - E) La capacità accomodativa
- 

**16) Un processo espansivo dell'emisfero sinistro provoca:**

- A) Emianopsia omonima sinistra
  - B) Emianopsia bitemporale
  - C) Emianopsia omonima destra
  - D) Emianopsia binasale
  - E) Emianopsia altitudinale
- 

**17) La sclerosi multipla determina nell'occhio:**

- A) Emianopsia
  - B) Uveite
  - C) Neurite ottica
  - D) Distrofia corneale
  - E) Cataratta
- 

**18) L'endotelio corneale da quanti strati è costituito:**

----- Questionario Q02 -----

- A) Uno
  - B) Due
  - C) Tre
  - D) Quattro
  - E) Oltre i quattro
- 

**19) I tumori più frequenti a livello del nervo ottico sono:**

- A) Emangiopericitomi
  - B) Meningiomi
  - C) Astrocitomi e meningiomi
  - D) Astrocitomi
  - E) Linfomi
- 

**20) La sindrome della loggia cavernosa comprende:**

- A) Miosi - ptosi - enoftalmo - paralisi del VI - sintomatologia trigeminale
  - B) Miosi - ptosi - enoftalmo - paralisi del VII - emisindrome cerebellare
  - C) Miosi - ptosi - enoftalmo - paralisi del VII - nistagmo
  - D) Miosi - ptosi - enoftalmo - paralisi del VI - emisindrome cerebellare
  - E) Miosi - ptosi - enoftalmo - paralisi del V, VI e VII
- 

**21) La novesina che tipo di anestetico è:**

- A) Locale di infiltrazione
  - B) Un anestetico odontoiatrico
  - C) Locale da contatto
  - D) nessuna delle altre risposte è corretta
  - E) Generale
- 

**22) Nel glaucoma cronico semplice il primo danno campimetrico è costituito da:**

- A) quadrantopsia
  - B) aumento della macchia cieca
  - C) denudamento della macchia cieca
  - D) emianopsia
  - E) scotoma centrale relativo
- 

**23) L'acinesia è:**

- A) Rilasciamento del retto superiore
  - B) Tecnica anestesologica topica per chirurgia oculare
  - C) Anomalia di posizionamento della rima palpebrale
  - D) Anomalia di impianto sopraciliare
  - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

----- Questionario Q02 -----

**24) Le micropsie seguono a:**

- A) Addensamento dei coni maculari
- B) Intorbidamento del parenchima corneale
- C) Distanziamento dei coni maculari
- D) Aumentato indice refrattivo della lente
- E) nessuna delle altre risposte è corretta

**25) Quanto astigmatismo corneale può essere corretto da una lente corneale rigida:**

- A) Tutto
- B) Fino a 3 diottrie
- C) Zero
- D) Fino a 2 diottrie
- E) Il 50%

**26) L'ambliopia funzionale è associata a:**

- A) Difetto percettivo binoculare
- B) Presenza di lesioni maculari
- C) nessuna delle altre risposte è corretta
- D) Assenza di lesioni maculari
- E) Difetto percettivo monoculare

**27) Il corpo vitreo è composto da:**

- A) Da acido ialuronico
- B) Da collagene
- C) Per la maggior parte da acqua
- D) nessuna delle altre risposte è corretta
- E) la prima e la terza

**28) L'ambliopia organica comporta:**

- A) Perdita della direzione principale visiva
- B) Difetto percettivo del campo visivo periferico
- C) Difetto percettivo del campo visivo centrale
- D) la prima e la terza
- E) nessuna delle altre risposte è corretta

**29) Una lente con fuoco a 25 cm ha un potere di:**

- A) 1 diottria
- B) 25 diottrie
- C) 2,5 diottrie
- D) 1,5 diottrie

**Azienda Sanitaria Locale di Potenza**

**CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI – IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA  
N. 3 Posti di C.P.S. ORTOTTISTA - Cat. D**

----- **Questionario Q02** -----

E) 4 diottrie

---

**30) La paralisi del muscolo ciliare nel giovane cosa comporta:**

- A) Le fibre della zonula sono più tese
  - B) Le fibre della zonula sono più rilasciate
  - C) Il raggio di curvatura della superficie del cristallino è più grande
  - D) La prima e la terza
  - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-