

----- Questionario Q03 -----

1) L'ectopia lentis si associa spesso a:

- A) Sindrome di Parinaud
 - B) Glicogenosi
 - C) Sindrome di Marfan
 - D) Trisomia del 13
 - E) Fenomeno di Bell
-

2) Il test di Farnsworth serve per esplorare le turbe del senso cromatico:

- A) principalmente sull'asse rosso - verde
 - B) su tutti gli assi
 - C) sotto luminanza mesopica
 - D) principalmente sull'asse giallo - blu
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

3) Si definisce ipopion:

- A) Raccolta di pus sterile in camera anteriore
 - B) Raccolta di pus settico in camera anteriore
 - C) Le prima e la seconda
 - D) Raccolta di sangue in camera anteriore
 - E) Raccolta di pura fibrina in camera anteriore
-

4) Per percezione simultanea si intende:

- A) La capacità di percepire due immagini disparate contemporaneamente con i due occhi
 - B) La capacità di distinguere a livello di coscienza percettiva l'immagine singola trasmessa dall'uno o dall'altro occhio
 - C) La capacità di percepire contemporaneamente immagini vicine e lontane
 - D) La capacità di percepire due immagini disparate o identiche contemporaneamente con i due occhi
 - E) La capacità di fondere due immagini fuori dall'area di Panum
-

5) Il muscolo costrittore della pupilla è innervato:

- A) Dal simpatico
 - B) Dal quarto paio di nervi cranici
 - C) Da entrambi
 - D) Dal parasimpatico
 - E) Dal sesto paio di nervi cranici
-

6) La soppressione sostanzialmente elimina nell'occhio interessato:

- A) La diplopia
- B) La confusione
- C) Il campo visivo in toto

----- Questionario Q03 -----

- D) nessuna delle altre risposte è corretta
 - E) Il campo visivo centrale
-

7) La malattia di Von Hippel Lindau consiste in:

- A) Una particolare forma di strabismo
 - B) Una grave forma di atrofia ottica bilaterale
 - C) Una angiomatosi della retina e del S.N.C.
 - D) Una forma tumorale dell'orbita
 - E) Una malformazione delle vie lacrimali
-

8) Nell'attacco acuto di glaucoma la pupilla appare:

- A) normo - reagente alla luce
 - B) miotica
 - C) midriatica e non reagente alla luce
 - D) non reagente alla luce
 - E) midriatica
-

9) Una lesione del nervo ottico di destra causerà:

- A) Areflessia pupillare destra
 - B) Assenza del riflesso fotomotore diretto destro
 - C) Assenza del riflesso fotomotore consensuale destro
 - D) Assenza del riflesso fotomotore diretto sinistro
 - E) Presenza del riflesso fotomotore consensuale sinistro
-

10) La visione binoculare comprende:

- A) La percezione simultanea
 - B) La stereopsi
 - C) La fusione
 - D) nessuna delle altre risposte è corretta
 - E) L'emmetropia
-

11) Il test di Schirmer primo stima:

- A) La secrezione lacrimale riflessa
 - B) La secrezione lacrimale basale
 - C) La secrezione lacrimale totale
 - D) La secrezione lacrimale nella componente sierosa
 - E) La secrezione lacrimale nella componente mucosa
-

12) Nella ptosi palpebrale paralitica è implicato:

- A) Il muscolo retto superiore

----- Questionario Q03 -----

- B) Il muscolo elevatore della palpebra superiore
 - C) Il muscolo tarsale superiore
 - D) Il muscolo orbicolare delle palpebre
 - E) nessuna delle altre risposte è corretta
-

13) Le paralisi di sguardo implicano:

- A) Diplopia
 - B) Vertigini
 - C) Deviazione del capo
 - D) Errata localizzazione dell'immagine
 - E) Nessuno di tali effetti
-

14) Un miope di 2 diottrie, non corretto, ha il punto remoto a:

- A) 25 cm
 - B) 50 cm
 - C) 2,5 m
 - D) 1 m
 - E) 5 m
-

15) La galattosemia provoca alterazioni a livello:

- A) Della cornea
 - B) Della retina
 - C) Del cristallino
 - D) Del nervo ottico
 - E) Del vitreo
-

16) La macropsia monoculare ha come conseguenza, dal punto di vista binoculare:

- A) Difficoltà di fusione binoculare
 - B) Soppressione ed ambliopia dell'occhio in causa
 - C) Nessuna delle conseguenze indicate
 - D) Metamorfopsie
 - E) Perdita di corrispondenza biretinica
-

17) Quale delle seguenti malattie infettive può essere causa di retinite pseudo pigmentosa?

- A) Toxoplasmosi
 - B) Toxocariosi
 - C) Morbillo
 - D) Candidosi
 - E) Brucellosi
-

----- Questionario Q03 -----

18) Le vie oculogire sovraintendono:

- A) All'oculomozione volontaria
- B) All'oculomozione sensorio - riflessa
- C) All'oculomozione automatico - riflessa
- D) nessuna delle altre risposte è corretta
- E) All'occlusione palpebrale

19) Sono funzione del muscolo obliquo superiore/ grande obliquo:

- A) Abduzione del globo
- B) Intorsione
- C) Depressione
- D) nessuna delle altre risposte è corretta
- E) La prima e la seconda

20) Quale delle seguenti affermazioni a proposito della papilla da stasi NON è corretta?

- A) di solito bilaterale
- B) causata da un aumento della pressione endocranica
- C) dolore al movimento oculare
- D) iperemia della testa del nervo ottico
- E) congestione venosa dei vasi arcuati e peripapillari

21) L'emeralopia consegue a disfunzionalità:

- A) Dei coni della retina periferica
- B) Dei coni para - maculari
- C) Dei bastoncelli
- D) Dei coni foveali
- E) Delle cellule bipolari

22) Il midriatico che può essere usato negli esami dei pazienti glaucomatosi cronici col minore effetto sull'aumento della pressione endoculare è:

- A) Ciclopentolato
- B) Fenilefrina
- C) Atropina
- D) Omatropina
- E) Tropicamide

23) In quali casi occorre proteggere la cornea con una pomata a base di vitamina A?

- A) Paralisi del VII
- B) Paralisi del V
- C) Paralisi del III
- D) La prima e la seconda

----- Questionario Q03 -----

E) nessuna delle altre risposte è corretta

24) L'elevatore della palpebra superiore è innervato da:

- A) III nervo cranico
 - B) IV nervo cranico
 - C) VI nervo cranico
 - D) Simpatico
 - E) Parasimpatico
-

25) L'emianopsia doppia causata da una lesione retrogenicolata si accompagna a:

- A) Normoreflettività pupillare alla luce
 - B) Ad assenza di percezione di buio totale
 - C) Ad oculomozione normale
 - D) nessuna delle altre risposte è corretta
 - E) La prima e la seconda
-

26) Le metamorfopsie sono segno di:

- A) Patologia retinica periferica
 - B) Astigmatismo lenticolare
 - C) Addensamento vitreale
 - D) Patologia retinica centrale
 - E) Astigmatismo corneale
-

27) La localizzazione spaziale delle immagini visive dipende:

- A) Dalla luminosità ambientale scotopica (buio)
 - B) Dall'integrazione tra retina e labirinti
 - C) Dalla loro distanza dal fuoco principale della retina
 - D) Dall'integrazione tra retina e propiocezioni muscolari oculari
 - E) Dall'integrazione del campo visivo ed il campo di fissazione con la presenza di disparità tra i due occhi
-

28) Un miope di 5 diottrie, corretto, ha il punto remoto a:

- A) 2 m
 - B) Infinito
 - C) 20 cm
 - D) 2,5 m
 - E) 1 m
-

29) Le tavole ETDRS sono:

- A) Un ottotipo per vicino
- B) Un ottotipo per lontano in cui i caratteri hanno una progressione geometrica

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI – IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA
N. 3 Posti di C.P.S. ORTOTTISTA - Cat. D**

----- Questionario Q03 -----

- C) Un ottotipo per lontano in cui i caratteri hanno una progressione aritmetica
 - D) Un ottotipo per la misurazione al contrasto
 - E) Un ottotipo per lontano e per vicino con progressione aritmetica
-

30) Nella filariosi si possono osservare alcune larve:

- A) Nella congiuntiva
 - B) Nell'iride
 - C) Le prime due
 - D) Nella cornea
 - E) Nel cristallino
-